

心臟類澱粉蛋白沉積症

帶來的破壞性影響



心臟類澱粉蛋白沉積症是當蛋白質錯誤摺疊並在心臟和身體其他部位積聚而引起的。¹

大部分心臟類澱粉蛋白沉積症個案為ATTR-CM (transthyretin amyloid cardiomyopathy, 轉甲狀腺素蛋白類澱粉樣心肌病變) 或AL (immunoglobulin light chain amyloidosis, 輕鏈型類澱粉蛋白沉積症)。²

ATTR-CM有以下特性：



會對生命構成威脅^{3,4}



確診率偏低^{3,4}



與心臟衰竭有關^{3,4}

心臟衰竭的症狀



呼吸急促^{4,5}



腫脹⁶

一項美國的病人意見調查發現⁷

診斷

心臟類澱粉蛋白沉積症患者的診斷過程，往往漫長和相當複雜



近

70%

的患者表示，在確診前，他們對心臟類澱粉蛋白沉積症症狀的關注和擔憂都被其他醫護人員忽視



超過一半

的患者表示，在確診前曾被誤診為另一種疾病

患者表示在確診前因出現了和心臟類澱粉蛋白沉積症有關的症狀，平均約見過

4-5



位醫生

心臟類澱粉蛋白沉積症

嚴重影響患者的生理及社交活動

76%

76%的患者認為，由於患有心臟類澱粉蛋白沉積症，往往須暫停他們正常的生活作息（例如避免從事以下活動）：



旅行



轉換工作



社交



運動

超過 70%

超過70%的患者表示，心臟類澱粉蛋白沉積症對他們的交往/親密關係產生了很大或極大的負面影響

將近 70%



近70%的心臟類澱粉蛋白沉積症患者表示他們一直感到不適

不能忽視

心臟類澱粉蛋白沉積症對患者情緒的影響

沮喪

充滿壓力

不知所措

患者形容患有心臟類澱粉蛋白沉積症之感受的常用詞彙

81%



的病人認為沒有人理解心臟類澱粉蛋白沉積症對他們日常生活造成的負面影響

2/3



的患者對自己目前的健康狀況感到非常或極度擔憂



瀏覽 HEARTSMATTR.com.hk，並向心臟科醫生查詢更多有關 ATTR-CM 的資訊

你並不孤單

若自己或親友確診患有ATTR-CM，請查看以下網站，有很多絕佳的資源可以幫助你們。



hkard.org



careheart.org.hk



cc.sjs.org.hk



pcfhk.org



hkhcf.org



美國輝瑞研製藥
香港鰂魚涌英皇道683號嘉里中心21樓
電話：(852) 2811 9711 傳真：(852) 2579 0599
網站：www.pfizer.com.hk

是次網上調查由Harris Poll代表輝瑞於2018年11月9日至2018年12月9日，針對335名18歲以上已被專業醫護人員確診患有心臟衰竭或心臟類澱粉蛋白沉積症的美國成年患者進行，其中75名為心臟類澱粉蛋白沉積症患者。